



Scheda Tecnica

DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO DISINFETTANTE

-PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n° 19803 del Ministero della Salute-

I. DESCRIZIONE PRODOTTO

Disinfect Puravir Fazzoletto è un Presidio Medico Chirurgico che disinfetta rapidamente la cute prevenendo le infezioni di batteri e virus. Grazie ai test effettuati su virus (Poliovirus type 1 e Adenovirus type 5) e batteri (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ed Enterococcus hirae) in prestigiosi studi di ricerca autorizzati dal Ministero Della Salute ne è stata infatti verificata la sua efficacia contro tali microrganismi.

E' indicato per la disinfezione della cute integra. E' particolarmente indicato nella disinfezione della cute e delle mani, anche prima delle iniezioni. Disinfect Liquido non macchia, non fa schiuma e non unge.

La presenza in formula di sodio ialuronato e glicerina, molecole emollienti perfettamente biocompatibili, rendono la pelle idratata e morbida. Il profumo senza allergeni rende il prodotto ancora più compatibile al contatto con la pelle, lasciando su di essa una gradevole profumazione. La sua compatibilità è infatti verificata tramite Patch Test che conferma la natura non irritante del prodotto, che risulta essere Dermatologicamente Testato.

II. COMPOSIZIONE CHIMICA

Componente	%	CAS	EINECS
Alcohol Denat.	80.00.00	64-17-5	200-578-6
Eccipienti e Acqua deionizzata q.b			

III. DATI TECNICI

ASPETTO	Fazzoletto imbevuto di soluzione disinfettante
ODORE	Caratteristico misto alcool
pH	5.5-6.5
DENSITA'	0.80-0.99 g/ml
VISCOSITA' LIQUIDO IMBIB.	15-35 mPa s



IV. MODALITA' D'USO

Applicare Disinfect Puravir Fazzoletto sulla zona interessata da disinfettare; per avere una buona azione disinfettante battericida e virucida, lasciare a contatto con la pelle per almeno un minuto.

V. AVVERTENZE

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso – Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Non impiegare per usi diversi da quello indicato.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di malessere ricorrere al medico per gli interventi di pronto soccorso.

VI. VALIDITA'

2 anni a temperatura ambiente